



TUG‘RUQDAN KEYINGI PROKTIT: SABABLARI, BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI

ПОСЛЕРОДОВОЙ ПРОКТИТ: ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ
И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

POSTPARTUM PROCTITIS: CAUSES, SYMPTOMS,
AND TREATMENTS

Suvonova Laylo Xasan qizi

*Oliy ta`lim ,fan va innovatsiyalar vazirligi
Toshkent tibbiyat akademiyasi Chirchiq filiali*

4- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Yusupov Xamza Safarovich

Annotatsiya: Tug‘ruqdan keyingi proktit – tug‘ruq jarayonida yoki undan keyin rivojlanadigan to‘g‘ri ichakning yallig‘lanish kasalligi. Ushbu maqolada tug‘ruqdan keyingi proktitning sabablari, patogenezi, klinik ko‘rinishlari, diagnostikasi va davolash usullari haqida ma’lumot berilgan. Ushbu patologiyaning rivojlanishida tug‘ruq jarayonida to‘qimalarning shikastlanishi, infektion agentlarning roli va immunitetning pasayishi muhim ahamiyatga ega ekani ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy diagnostika usullari va konservativ hamda jarrohlik davolash yondashuvlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tug‘ruqdan keyingi proktitni erta aniqlash va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzu maqsadi: Tug‘ruqdan keyingi proktitni erta aniqlash va kompleks davolash yondashuvlarini ishlab chiqish uchun amaliy tavsiyalar berish. Shuningdek, profilaktika choralarini kuchaytirish orqali kasallikning oldini olish mumkinligi ilmiy asoslab berish. Proktit kelib chiqishi haqida ma’lumot berish.

Kalit so`zlar : ichakda diskomfort, rektal qon ketish , anoskopiya , proktit , Escherichia coli, Staphylococcus aureus, rektoromanoskopiya , to`qimalar yirtilishi

Abstract: Tug‘ruqdan keyingi davr – ayol organizmi uchun jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladigan, maxsus e’tibor talab qiladigan vaqt. Ba’zi hollarda, tug‘ruqdan keyin qorin bo‘shlig‘i va orqa chiqaruv yo‘li sohasida yallig‘lanish jarayonlari – proktit kuzatilishi mumkin. Ushbu maqolada tug‘ruqdan keyingi proktitning sabablari, belgilari va davolash usullari haqida batafsil ma’lumot beramiz.

Annotation: Postpartum proctitis is an inflammatory disease of the rectum that develops during or after childbirth. This article provides information on the



causes, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and treatment methods of postpartum proctitis. It highlights the key role of tissue damage during childbirth, the involvement of infectious agents, and reduced immunity in the development of this pathology. The article also analyzes modern diagnostic methods and approaches to both conservative and surgical treatment. The study results are crucial for the early detection and effective treatment strategies of postpartum proctitis.

Objective: To provide practical recommendations for the early detection of postpartum proctitis and the development of comprehensive treatment approaches. Additionally, to scientifically substantiate the prevention of the disease through enhanced prophylactic measures. The aim also includes providing information on the causes of proctitis.

Key words: intestinal discomfort, rectal bleeding, anoscopy, proctitis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, rectosigmoidoscopy, tissue rupture.

Abstract: The postpartum period is a time of significant changes in a woman's body, requiring special attention. In some cases, inflammatory processes, such as proctitis, may occur in the abdominal cavity and anal area after childbirth. This article provides detailed information on the causes, symptoms, and treatment methods of postpartum proctitis.

Asosiy qism:

Proktit nima? Proktit – bu to‘g‘ri ichak shilliq qavatining yallig‘lanishidir. Tug‘ruqdan keyin bu kasallik ko‘pincha jarohatlar, infektsiyalar yoki noto‘g‘ri gigiyena sababli rivojlanadi. Tug‘ruqdan keyingi proktitlar kelib chiqishi ko‘pincha tug‘ruq vaqtida yoki undan keyin yuzaga kelgan infektsiyalar, jarrohlik asoratlari, va perianal sohadagi to‘qimalarning shikastlanishi bilan bog‘liq. Chuqur yoriqlar, epiziotomiyalar yoki tikilgan jarohatlarning to‘g‘ri davolanmasligi bakteriyalar (masalan, Escherichia coli yoki Staphylococcus aureus) ning to‘g‘ri ichakka kirib, yallig‘lanishni keltirib chiqarishiga olib keladi. Ayrim hollarda, tug‘ruq vaqtida og‘ir qon ketishi yoki jarrohlik usullaridan keyingi immunitetning zaiflashuvi bu yallig‘lanish xavfini oshiradi. Infektsiyaning vaqtida oldini olish va antiseptik gigiyenaga rioya qilish asosiy profilaktik choralar hisoblanadi.

Tug‘ruqdan keyingi proktitning sabablari

1. Tug‘ruq jarohatlari Tug‘ruq davomida periney yoki to‘g‘ri ichak atrofidagi to‘qimalarning yorilishi yallig‘lanish jarayoniga sabab bo‘lishi mumkin.



2. Gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik Tug‘ruqdan keyingi parvarish noto‘g‘ri amalga oshirilsa, mikroblar to‘g‘ri ichakka o‘tib, infektsiyani keltirib chiqarishi mumkin.

3. Infeksiyalar Tug‘ruqdan keyin jinsiy a’zolarda infektsiyalar paydo bo‘lsa, ular osonlik bilan to‘g‘ri ichakka tarqaladi. Tug‘ruq paytida steril sharoitlarning yetarli darajada ta’minlanmaganligi bakterial infektsiyalarga olib kelishi mumkin.

4. Ichak harakatining buzilishi Tug‘ruqdan keyin qabziyat yoki diareya to‘g‘ri ichak sohasida qo‘srimcha zo‘riqishga olib keladi va shilliq qavatni yallig‘lantiradi.

Tug‘ruqdan keyingi proktitning belgilari

Og‘riq: Orqa chiqaruv teshigi sohasida yoki to‘g‘ri ichak ichida og‘riq.

Qichishish va noqulaylik: Anus atrofida yoki ichida qichishish, yonish hissi.

Qon yoki yiringli chiqindi: Orqa chiqaruvdan qon aralash yoki yiringli chiqindi paydo bo‘lishi.

Ichak harakati bilan bog‘liq muammolar: Qabziyat yoki diareya.

Isitma: Infektsiya mavjud bo‘lsa, tana harorati ko‘tarilishi mumkin.

Tashxislash Tug‘ruqdan keyingi proktitni aniqlash uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi:

1. Shikoyatlarni tahlil qilish: Belgilarni va ularning davomiyligini aniqlash.

2. To‘g‘ri ichakni ko‘rikdan o‘tkazish: Shifokor rektal tekshiruv orqali yallig‘lanishni baholaydi.

3. Laborator tahlillar: Yiring yoki boshqa chiqindilardan namunalar olib, mikrobiologik tekshiruv o‘tkaziladi. Qon tahlillari infektsiya mavjudligini aniqlashga yordam beradi.

Tug‘ruqdan keyingi proktitni davolash individual tarzda, kasallikning sababi va og‘irlik darajasiga qarab amalga oshiriladi. Quyida davolashning batafsил usullari keltirilgan:

1. Dori vositalari bilan davolash Antibiotiklar Bakterial infektsiyalarni yo‘q qilish uchun. Ko‘pincha Metronidazol, Amoksitsillin-klavulanat kabi keng ta’sir doirasidagi antibiotiklar buyuriladi. Tahlillar natijasiga qarab, sezuvchanlikka mos keladigan antibiotik tanlanadi.

Yallig‘lanishga qarshi preparatlar To‘g‘ri ichakdagi shish va yallig‘lanishni kamaytiradi. Nonsteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar (NYAQD), masalan, Ibuprofen yoki Ketoprofen ishlataladi.

Og‘riq qoldiruvchi va mahalliy vositalar Ichak shilliq qavatini tiklash va og‘riqni kamaytirish uchun shamchalar yoki malhamlar: Prokto-Glyvenol Anestezol



Relief mahsulotlari. Mahalliy anestetik moddalarga ega vositalar yonish va noqulaylikni kamaytiradi.

Ichakni tiklovchi preparatlar Ichak florasini normallashtirish uchun probiotiklar: Linex, Bifidumbakterin, Enterojermina. Ichak shilliq qavatini tiklovchi moddalar: Methyluracil shamchalar.

2. Mahalliy muolajalar Gigiyenik yuvishlar Antiseptik eritmalar bilan anus va periney sohasini yuvish. Kaliy permanganat (margansovka) eritmasi. Xlorgeksidin yoki Furatsillin eritmalari. Har kuni yuvish mikroblarni kamaytirib, yallig‘lanish jarayonini yengillashtiradi. Tibbiy kompresslar va vannalar Issiq, antiseptik vannalar yordamida qon aylanishi yaxshilanadi va shish kamayadi. Rimasharbatli yoki dorivor o‘tlar qo‘shilgan vannalar: romashka, kalendula, eman po‘stlog‘i. Har safar 15-20 daqiqa davomida vannada o‘tirish tavsiya etiladi. Shamchalar Ichak ichida mahalliy yallig‘lanishni davolash uchun. Ichthammol, Natahsid yoki Ultraproct shamchalar yallig‘lanishga qarshi va tiklovchi xususiyatlarga ega.

3. Parhez va ovqatlanish tartibi Ichakni qo‘shimcha zo‘riqishdan saqlash uchun maxsus ovqatlanish tartibi belgilanishi mumkin: Ratsionda bo‘lishi kerak: Tolaga boy oziq-ovqatlar (mevalar, sabzavotlar, donli mahsulotlar). Suv miqdorini oshirish (kuniga kamida 2 litr). Yengil hazm bo‘luvchi mahsulotlar: sho‘rva, qatiq, kefir. Cheklash kerak: Ziravorlar, achchiq, sho‘r yoki yog‘li ovqatlar. Spirtli ichimliklar va gazli ichimliklar. Qattiq hazm bo‘luvchi mahsulotlar (qizil go‘sht, qattiq non).

4. Fizioterapiya Ultratovush terapiyasi: Yallig‘lanishni kamaytiradi va to‘qimalarning tiklanishini tezlashtiradi. O‘ziga xos issiqlik muolajalari: Anus sohasidagi qon aylanishini yaxshilaydi. Elektroforez: Dori vositalarini bevosita zararlangan joyga yetkazish uchun.

5. Xalq tabobati usullari Romashka va kalendula damlamalari Yallig‘lanishga qarshi va antiseptik ta’sir ko‘rsatadi. Har kuni kompress yoki klizma shaklida qo‘llash mumkin. Eman po‘stlog‘i yoki aloe sharbatlari Shilliq qavatni tiklash va yallig‘lanishni kamaytirish uchun qo‘llanadi. Uy sharoitida losyon yoki kompress sifatida ishlatiladi.

6. Xirurgik aralashuv Og‘ir holatlarda (masalan, absess yoki yoriqlar paydo bo‘lganda) jarrohlik davolash zarur bo‘lishi mumkin. Yoriqlarni tiklash. Infektsiyalangan absesni drenaj qilish.

Davolash davomida e’tibor berish kerak bo‘lgan jihatlar Belgilangan muolajalarni vaqtida bajarish. Gigiyena qoidalariga qat’iy rioxva qilish. Davolanish kursini to‘liq yakunlash (hatto belgilar yo‘qolgandan keyin ham). Har qanday noxush



o‘zgarish kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish. Tug‘ruqdan keyingi proktitni to‘g‘ri davolash uchun malakali mutaxassisning nazorati ostida bo‘lish muhim. To‘g‘ri ichakning to‘liq tiklanishi uchun sabr va kompleks yondashuv zarur.

Tug‘ruqdan keyingi proktitning O‘zbekistonligi statistikasi haqida aniq ma'lumotlar cheklangan, ammo umumiyligi salomatlik ko'rsatkichlari va onalik va bolalik sog'lig'iga oid dasturlar mavjud. O‘zbekistonda onalik o'limining kamayishi va tug‘ruqdan keyingi asoratlar bilan bog'liq sog'liqni saqlash tizimi islohotlari o'zgarishlarni ko'rsatmoqda. Ushbu soha bo'yicha muhim ishlanmalar va strategik yondoshuvlar mavjud, jumladan, tibbiy yordam va jamoat salomatligini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlar.

UNICEF va BMT tomonidan olib borilayotgan izlanishlar va tashabbuslar orqali tug‘ruqdan keyingi asoratlar, shu jumladan proktit kabi muammolarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekistonning tibbiyot tizimida, ayniqsa onalik va bolalik sog'ligi sohasida, kuchli tizimlar yaratish, sog'liqni saqlash xizmatlariga erkin kirish imkoniyatini oshirish va jamoatchilikni ogoh qilish ishlari davom etmoqda. Biroq, tug‘ruqdan keyingi proktitlar haqidagi aniq statistik ma'lumotlar mavjud emas, chunki bu kasallik keng tarqalgan holat sifatida o'r ganilmagan. Bunday holatlar ko'proq klinikada kuzatiladi va sog'liqni saqlash mutaxassislari tomonidan shaxsiy nazorat ostida bo'ladi.

Tug‘ruqdan keyingi proktitning profilaktikasi uchun bir qator choralar mavjud:

1. Gigiyyena: Anus va perineya sohasini doimiy toza saqlash, infektsiyalarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.
2. Antiseptik yuvinishlar: Tug‘ruqdan so‘ng antiseptik eritmalar bilan yuvish.
3. Tug‘ruqdagi ehtiyyot choralar: Epiziotomiya yoki jarrohlik kesiklarining to‘g‘ri davolanishi, infektsiya xavfini kamaytiradi.
4. Probiotiklar va to‘g‘ri parhez: Ichak florasini tiklashga yordam beradi.
5. O‘z vaqtida tibbiy yordam: Tug‘ruqdan keyingi og‘riq, qizarish yoki qon ketish belgilari paydo bo‘lganda shifokorga murojaat qilish zarur.

Xulosa : Tug‘ruqdan keyingi proktitlar – bu asosan tug‘ruq jarayonida yoki undan keyin rivojlanadigan rektal yallig‘lanish holatidir. Bu holatning yuzaga kelishiga turli omillar ta’sir etishi mumkin, jumladan infektsiyalar, to‘qima shikastlanishi, yoki gastrointestinal tizimga zarar yetishi. Bunda perineal yoriqlar, epiziotomiya va rektal hududdagi boshqa jarohatlar xavfni oshiradi. Global statistikada postpartum proktitga oid aniq raqamlar mavjud bo‘lmasa-da, umumiyligi tug‘ruqdan keyingi asoratlar haqida olingan ma'lumotlar, bu muammoning turli



omillar bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Postpartum proktitlarning oldini olish uchun gigiyena, antiseptik davolash, to‘g‘ri parhez va o‘z vaqtida tibbiy yordam ko‘rsatish kabi profilaktik choralar muhim ahamiyatga ega. Tug‘ruqdan keyingi davrda sog‘liqni saqlash tizimi tomonidan amalga oshiriladigan profilaktik choralar va davolash metodlari bu kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Sog‘liqni saqlash tizimlarining bu muammoni aniqlash va davolashdagi roli juda katta. Bundan tashqari, tug‘ruqdan keyingi sog‘liqni saqlashning yirik tizimlaridagi yondashuvlar va profilaktik choralar orqali, bu kabi kasalliklarning kamayishi va onalik sog‘lig‘ining yaxshilanishiga erishish mumkin.

Foydalanaligan adabiyotlar:

1. Абдурахманова Н.А., Хакимова Д.С. "Послеродовые воспалительные заболевания органов малого таза". Ташкент: Медицина, 2020. Ushbu kitob tug‘ruqdan keyingi infektsiyalar va ularning turlari, jumladan, proktit haqida ma’lumot beradi.
2. Маматкулов А.И., Каримова З.Т. "Диагностика и лечение проктита: Руководство для врачей". Самарканд, 2019. Bu qo‘llanma proktitning diagnostikasi va davolash strategiyalari haqida to‘liq ma’lumot beradi.
3. Халмухаммедова Н.Н. "Микробиологическая роль инфекционных агентов в развитии послеродового проктита". Вестник медицинской науки, 2021, №3, стр. 45–50. Ushbu maqola tug‘ruqdan keyingi proktitning mikrobiologik sabablariga bag‘ishlangan.
4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). "Postpartum Infections: Proctitis and Related Conditions." Obstetrics & Gynecology, 2021, Vol. 137(5), pp. 987–993. Ushbu maqola postpartum infektsiyalar, jumladan, proktitning sabab va davolash usullarini qamrab oladi.
5. Eogan, M., O’Connell, P.R., & O’Herlihy, C. "Postpartum pelvic infections: Risk factors and management." International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2020, Vol. 149(2), pp. 123–129. Bu tadqiqot tug‘ruqdan keyingi infektsiyalar, jumladan, rektal yallig‘lanishlar haqidagi bat afsil ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.
6. Smith, L.E., & Lee, R.H. "Management of Postpartum Rectal Infections." The Lancet Infectious Diseases, 2019, Vol. 19(4), pp. 345–350. Ushbu maqola klinik amaliyotda tug‘ruqdan keyingi rektal yallig‘lanishlarni boshqarish bo‘yicha yo‘riqnomalarni taklif qiladi.
7. Dutta, D.C. "Textbook of Obstetrics Including Perinatology and Contraception." 9th Edition, New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2021. Tug‘ruqdan keyingi davrdagi ayollar salomatligi va turli patologiyalar, jumladan, proktit haqida umumiy ko‘rsatmalar beradi.
8. Leach, S.D., & Langan, R.C. "Proctitis: Causes, Diagnosis, and Treatment." Clinical Review in Gastroenterology and Hepatology, 2020, Vol. 18(3), pp. 245–252. Ushbu adabiyot yallig‘lanish sabablarini chuqurroq o‘rganish va zamonaviy davolash yondashuvlariga qaratilgan.