

BACHADONDA ERROZIYANING TURLI HOLATLARI

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

UMAROVA RA'NOGUL OLIM QIZI

Annotatsiya: Ushbu maqola bachadonda erroziya kasalligi kelib chiqish sabablari, klinikasi davolash, bu kasallikda zamonaviy davolash usullarini qo'llash, zamonaviy texnikalardan foydalanishga mo'ljallangan.

Abstract: This article is intended to discuss the causes of uterine erosion, its clinical manifestations, treatment, application of modern treatment methods in this disease, and the use of modern techniques.

Аннотация: Данная статья призвана описать причины возникновения эрозивной болезни матки, ее клиническое лечение, применение современных методов лечения при этом заболевании, а также применение современных методик.

Bachadon bo'yni eroziyasi - bachadon bo'yni vaginal qismining shilliq qavatidagi xavfli o'zgarish. Bu eng keng tarqalgan ginekologik kasalliklardan biri bo'lib, statistik ma'lumotlarga ko'ra, har olti ayoldan birida uchraydi. Bachadon bo'yni eroziyasi - bachadon bo'yni vaginal qismining shilliq qavatidagi yarali o'zgarishlar. Bu eng keng tarqalgan ginekologik kasalliklardan biri bo'lib, statistik ma'lumotlarga ko'ra, har olti ayoldan birida uchraydi. Bachadon bo'yni haqida tushuncha Bachadon bo'yni bachadonning qin ichiga chiqadigan eng quyi qismidir. Uning ichida servikal kanal joylashgan. Uning yuqori qismi bachadonga kiradi, pastki qismi standart ginekologik tekshiruv vaqtida ko'rinadi (tug'magan ayollarda dumaloq teshik, tug'ilgan ayollarda esa ko'ndalang). Bu eroziyaga olib keladigan bachadon bo'yni vaginal qismini o'rab turgan tekis ko'p qatlamli epiteliyning shikastlanishi. Kasallik bir necha yil davom etishi mumkin. Bu bachadon bo'yni yallig'lanishining sababidir. Yallig'lanishning kamayishi natijasida (shifokor tomonidan ko'rsatilgan dorilar yordamida yoki mustaqil ravishda) silindrsimon epiteliya yana tekis epiteliya bilan almashtiriladi. Bu eroziyani davolashning ikkinchi bosqichi bo'lib, unda bachadon bo'yni epiteliyasi tiklanadi. Yaqinda yallig'lanish joyida kichik kistlar qolishi mumkin. Ko'pgina hollarda eroziya hech qanday tarzda o'zini namoyon qilmaydi. Ayol yoqimsiz his-tuyg'ularni boshdan kechirmaydi, oddiy turmush tarzini olib boradi va faqat ginekolog tomonidan muntazam tekshiruv vaqtida u bachadon bo'yni yallig'lanish kasalligini davolash kerakligini aniqlaydi.

Ba'zida kasallik o'zini namoyon qiladi: vaginal traktdan ko'p miqdorda shilliq yoki yiringli suyuqlikning chiqishi; jinsiy aloqa paytida og'riq; qon tusli suyuqlik chiqishi (haqiqiy eroziyaga xos).

Ammo har holda, kolposkopiya ham amalga oshiriladi (bachadon bo'yni va qinni kattalashtirish ostida tekshirish) va onkologik kasalliklarni istisno qilish uchun eroziya yuzasidan smear olinadi va tahlil qilinadi. Bachadon bo'yni tasvirni 25-32 marta oshiradigan optik qurilma bilan tekshirish butunlay og'riqsizdir. Ushbu manipulyatsiya shifokorga aniq tashxis qo'yish va to'g'ri davolanishni buyurish imkonini beradi. Bundan tashqari, gepatit, flora testlari va boshqa kasalliklar uchun tahlillar o'tkaziladi. Bachadon bo'yni psevdoroziyasi - bu diametri 5 mm bo'lgan dumaloq qizil maydonga tegishli bo'lib, unda yiring paydo bo'lishi mumkin, ayniqsa kasallik uzoq vaqt davom etsa, aksariyat hollarda shunday bo'ladi. bo'ladi Pseudoeroziya qonda yuqori darajadagi ayol gormonlari bo'lgan qizlarga xosdir va bachadon bo'yni kanalining chegarasidan tashqariga chiqishi mumkin. Pseudoeroziya xavfi shundaki, u sifatsiz shaklga aylanishi mumkin. Bachadon bo'yni eroziyasini davolash majburiydir, chunki bu kasallikni e'tiborsiz qoldirish yomon yoki sifatli o'smalarning rivojlanishiga, shuningdek kasallikning og'ir shakllariga olib keladi. O'z vaqtida kompleks davolash nafaqat ayollarning sog'lig'iga hech qanday zarar etkazmaydi, balki umuman olganda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, davolanish individual bo'lishi kerak. Kasallikning operativ bo'lmagan davosi ham samarali bo'lishi mumkin, bu erda kasallikning og'irligi, hajmi, tuzilishi va birgalikda mavjud bo'lgan kasalliklar mavjudligiga qarab ma'lum bir usul tanlanadi. Eroziyani davolashning bir qismi sifatida bemorlarga yallig'lanishga qarshi va gormonal, shuningdek antibakterial va antiviral preparatlar, shu jumladan mahalliy preparatlar buyuriladi. Qo'shimcha davolash sifatida odatda immunitetni kuchaytiruvchi va umumiy mustahkamlovchi vositalar buyuriladi. Agar patologiya erta bosqichda aniqlansa, uni jarrohlik usullaridan foydalanmasdan to'liq davolash mumkin. Ginekolog har bir bemor uchun to'liq individual davolanishni belgilaydi. Ba'zida davolanish dori vositalari yordamida eroziya sababini bartaraf etishdan iborat bo'lishi mumkin. Bunday holda, yallig'lanishga qarshi va gormonal preparatlar buyuriladi. Agar kerak bo'lsa, antibakterial va antiviral preparatlar, shuningdek, immunomodulyar dorilar tananing immunitetini va turli virusli kasalliklarga chidamliligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin, chunki bachadon bo'yni eroziyasi mavjud bo'lganda, genital infeksiyalarni yuqtirish ehtimoli sezilarli darajada oshadi. Servikal eroziyaning klinik holatlari jarrohlik aralashuvni talab qiladi. Zamonaviy ginekologiya eroziyani davolashning bir necha usullarini taklif qiladi: Jarrohlik aralashuvi faqat favqulodda holatlarda, shilliq qavatning shikastlanish maydoni juda katta bo'lganda va test natijalari onkologik jarayonning rivojlanish ehtimoli yuqori

bo'lganida tavsiya etiladi. Bachadon bo'yni eroziyasi bilan og'rigan bemorlar bachadon bo'yni saratoni rivojlanishini istisno qilish uchun har yili (yiliga kamida 1-2 marta) ginekologik tekshiruvdan o'tishlari kerak. Muhim bo'lmagan holatlarda ginekologlar bepust bemorlarga eroziyani davolashni tavsiya etmaydi. Chunki har qanday holatda ham ayolning reproduktiv tizimiga jarrohlik aralashuvlar o'z izini qoldiradi va sog'lom homiladorlik va tug'ish uchun bachadon bo'yni shilliq qavatining elastikligi va tabiiy muhiti zarur. Qo'shimchada gormonal darajadagi o'zgarishlar tufayli eroziya yo'qolishi mumkin. Biroq, bunday hollarda ginekologning kuzatuv juda zarur. Shunisi e'tiborga loyiqki, har yili o'tkaziladigan tibbiy ko'riklar va ayollar salomatligiga zamonaviy ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish tufayli so'nggi yigirma yil ichida reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadon bo'yni saratoni ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin bo'ldi.

1. <https://bilim.tma.uz/articles/318>
2. <https://ghealth121.com/treatments/brain-hemorrhage/?lang=uz>
3. Ruzimurotova Y. S., Axrorova G. M. Socio-hygienic Study of the Health, Lifestyle and Working Conditions of Health Workers //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 165-170.